

## ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19<sup>1</sup>

Esta enquisa pretende ser útil para que a cidadanía poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.

**Non é necesario presentala en ningún lugar.**

**De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde.**

<i>Presentou nas últimas 2 semanas?</i>		<i>SI</i>	<i>NON</i>
Síntomas respiratorios	Febre maior de 37,5°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tose seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dificultade respiratoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outros síntomas	Fatiga severa (cansazo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dor muscular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Falta de olfacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Falta de gusto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Diarrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***No caso de ter actualmente síntomas, sinalar cales e cando comezaron:***

--

		<i>SI</i>	<i>NON</i>
<b>Tivo CONTACTO nas últimas 2 semanas?</b>	cunha persoa COVID-19 + confirmado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONVIVIU nas últimas 2 semanas?</b>	cunha persoa COVID-19 + confirmado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> A interpretación dos resultados da enquisa realizarase tendo en conta os criterios clínicos e epidemiolóxicos. Tendo en conta a definición do Ministerio de Sanidade de caso sospeitoso por SARS-CoV-2: calquera persoa cun cadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de calquera gravidade que cursa, entre outros, con febre, tose ou sensación de falta de aire. Outros síntomas atípicos como a dor de garganta, perda do olfacto, perda do gusto, dores musculares, diarreas, dor torácico ou cefaleas, de inicio brusco e sen causa aparente, entre outros, poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico.